

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Бинафин**

**Торговое название препарата:** Бинафин

**Международное непатентованное название (МНН):** тербинафин.

**Лекарственная форма:** 1% крем.

**Химическое название:** [(E)-N-(6,6-диметил-2гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталинметанамина гидрохлорид].

1 г крема содержит в качестве активного вещества тербинафина гидрохлорид – 10 мг и вспомогательные вещества в % по массе: кетомакрогол 1000 – 2,0, кетостерилловый спирт – 8,0, белый мягкий парафин – 12,0, жидкий парафин – 10,0, изопропилмиристат – 5,0, метилпарабен - 0,15, пропилпарабен – 0,0045, натрия кислый фосфат – 0,62, вода очищенная – 61,10.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Противогрибковое средство.

**Показания для применения:**

Грибковые инфекции кожи, вызванные дерматофитами, такими как *Trichophyton* (например, *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*, *T. interdigitale*, *T. tonsurans*, *T. gypseum*), *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*.

Дрожжевые инфекции кожи, в основном те, которые вызываются родом *Candida* (например, *Candida albicans*).

Разноцветный лишай (*Pityriasis versicolor*), вызываемый *Pityrosporum orbiculare* (также известный под названием *Malassezia furfur*).

**Противопоказания для применения:**

Повышенная чувствительность к бинафину или к любому другому компоненту, входящему в состав крема.

**Режим дозирования и способ применения:**

*Взрослые и дети с 12 лет и старше:*

Бинафин можно наносить на кожу один или два раза в сутки. Перед нанесением крема необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Крем накладывают тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки и слегка втирают. При инфекциях, сопровождающихся опрелостью (под молочными железами, в межпальцевых промежутках, между ягодицами, в паховой области), места нанесения крема можно прикрывать марлей, особенно на ночь.

Средняя продолжительность лечения:

Дерматомикоз туловища, голеней: 1 неделя 1 раз в день.

Дерматомикоз стоп: 1 неделя 1 раз в день.

Кандидоз кожи: 1-2 недели 1 или 2 раза в день.

Разноцветный лишай: 2 недели 1 или 2 раза в день.

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекции. В случае если через две недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует провести верификацию диагноза.

*Применение препарата у лиц пожилого возраста*

Нет оснований предполагать, что для лиц пожилого возраста требуется изменять дозирование препарата или что у них отмечаются побочные действия, отличающиеся от таковых у пациентов более молодого возраста.

*Применение препарата у детей*

Не рекомендуется применение данного препарата у детей до 12 лет.

**Меры предосторожности при применении:**

Крем бинафин предназначен только для наружного использования. Следует избегать попадания препарата в глаза.

**Передозировка:**

О случаях передозировки бинафина не сообщалось. Если же случайно препарат будет принят внутрь, можно ожидать развития таких же побочных явлений, как и при передозировке таблеток бинафина: тошнота, нарушение аппетита, боли в верхней половине живота, диарея.

**Побочные действия:**

В месте нанесения препарата в редких случаях отмечалось покраснение, ощущение зуда или жжения, однако эти явления редко приводили к необходимости прекращать лечение. Эти вышеназванные симптомы следует отличать от аллергических реакций, например крапивницы, которые возникают редко, однако при их появлении необходимо прекратить лечение.

**Взаимодействия с другими лекарственными средствами:**

В настоящее время лекарственные взаимодействия неизвестны.

**Особенности применения препарата в период беременности и лактации:**

Препарат во время беременности следует применять только по очень строгим показаниям и если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

**Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

До настоящего времени случаев влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами отмечено не было.

**Условия хранения:**

В сухом месте при температуре от 2° до 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек.**

Отпускают без рецепта.

**Срок годности:**

3 года.

Препарат не следует использовать после срока, указанного на упаковке.

**Изготовитель:**

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.», Индия

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд, Андери (Ист.), Мумбай – 400 099.

Претензии потребителя направлять по адресу представительства:

111033 Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21

тел.: (495) 970-15-80